

DR MICHAELS ŻEL MYJĄCY 200 ML



cena: 136,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	kosmetyk
Producent	Dr. Micheals
Wysyłka	1-2 dni
Zastosowanie	na łuszczycę

Opis produktu

DR MICHAELS ŻEL MYJĄCY polecany do mycia skóry ciała i skóry głowy ze zmianami łuszczycowymi. Produkt posiada doskonałe właściwości złuszczające, czyniąc skórę gładką i miękką. Likwiduje zrogowaciałe warstwy naskórka, zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia. Łagodzi świąd oraz działa wspomagająco na procesy regeneracji skóry.

Preparat przyjazny w użyciu. Nie zawiera sterydów.

DZIAŁANIE:

- złuszcza
- wygładza
- likwiduje zrogowaciałe warstwy naskórka
- zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia
- łagodzi świąd
- działa wspomagająco na procesy regeneracji skóry

STOSOWANIE:

SKÓRA GŁADKA:

- Na wilgotną skórę, w obrębie zmian łuszczycowych, należy nanieść niewielką ilość żelu, doprowadzając do powstania piany.

Po około 5-8 minutach zmyć ciepłą wodą i delikatnie osuszyć ręcznikiem.

Wskazane jest stosowanie żelu dwa razy dziennie – rano i wieczorem.

SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY:

- Po zastosowaniu wieczorem dnia poprzedniego odżywkę regenerującą, rano należy umyć głowę niewielką ilością żelu.

Następnie po upływie 5-8 minut spłukać ciepłą wodą.
Włosy suszyć w niezbyt wysokiej temperaturze.

Zalecany czas kuracji: 4-6 tygodni

Żel myjący można stosować do codziennej pielęgnacji skóry głowy.

SKŁAD:

- AQUA
- ETHANOL
- SODIUM LAURYL SULFATE
- COCAMIDO DIPROPYL BETAINE
- TRIETHANOLAMINE
- TEA LAURYL SULFATE
- SALICILIC ACID
- COAMIDE DEA
- CARBOMER (CARBOPOL)
- CITRIC ACID
- GLICOLIC ACID
- TETRASODIUM EDTA
- METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
- METHYLISOTHIAZOLINONE

INFORMACJE DODATKOWE:

- W celu wykluczenia reakcji alergicznych, preparat należy zastosować na niewielkiej powierzchni ciała zgodnie z podanym sposobem użycia. Obserwować do 48 godzin, czy nie pojawią się zmiany skórne, świadczące o nadwrażliwości na składniki preparatu.
- Nie stosować na skórę twarzy i narządów płciowych.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przez 3 godziny od zastosowania preparatu unikać przebywania na słońcu.
- Przy wystąpieniu nagłego świądu, zaczerwienienia skóry, preparat należy zmyć i skontaktować się z lekarzem.