

Orofar Max, 2 mg + 1 mg, 20 pastylek

cena: 20,00 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2 mg+1 mg
Kategoria	Lek
Opakowanie	20 pastylek
Postać	pastylki twarde
Producent	Novartis
Substancja czynna	Chlorek cetylopirydyniowy (Cetylpyridinii chloridum)
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Orofar Max to lek w postaci tabletek do ssania wskazany w:

- leczeniu antyseptycznych stanów zapalnych gardła i jamy ustnej
- łagodzeniu dolegliwości bólowych w tych stanach.

Wskazania:

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: cetylopirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowodorek (Cetylpyridinii chloridum, Lidocaini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Jedna pastylka twarda Orofar MAX zawiera:

2 mg cetylopirydyniowego chlorku
1 mg lidokainy chlorowodorku.

Dawkowanie:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Maksymalna dawka dobową: nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

Orofar Max jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować go dłużej niż 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL.

Możliwe działania niepożądane :

Jak każdy lek, Orofar MAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko może wystąpić przemijające podrażnienie jamy ustnej i gardła, mogą także wystąpić nudności i wymioty.

Producent:

NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa