

## Voltaren Emulgel 1% żel 0,01 g/1g 100 g

cena: 32,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/1g
Kategoria	Lek
Opakowanie	100 g (tuba)
Postać	żel
Producent	Novartis
Substancja czynna	Diklofenak (Diclofenacum)
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

**Lek Voltaren Emulgel 1%** jest żelem przeznaczonym do wcierania w skórę. Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Voltaren Emulgel 1% wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

**Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu:**

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń)
- bólu pleców
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty)
- ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów

#### Stosowanie:

Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Voltaren Emulgel 1% (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm<sup>2</sup> do 800 cm<sup>2</sup>. Po zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.

#### Skład:

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy (Diclofenacum natricum) w postaci soli dietyloamoniowej diklofenaku. 100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodowego w postaci 1,16 g soli dietyloamoniowej diklofenaku.

Substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45- zawiera benzoesan benzylu), woda oczyszczona.

**Przeciwwskazania:**

Znana nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Voltaren Emulgel jest także przeciwwskazany u tych pacjentów, u których astma, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Ostatni trymestr ciąży.

Dzieci i młodzież poniżej 14 lat.

**Ważne informacje:**

Lek zawiera glikol propylenowy i benzoesan benzylu, które u niektórych osób mogą powodować podrażnienia skóry.

Lek można stosować tylko na nieuszkodzoną skórę, jeśli po użyciu żelu pojawi się wysypka to należy zaprzestać jego używania. Żelu nie należy stosować na duże powierzchnie skóry, ani przez dłuższy czas niż zaleca się.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

**Ciąża i karmienie piersią:**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Podczas pierwszych pierwszych 6 miesięcy ciąży Voltaren Emulgel 1% można stosować na polecenie lekarza. W ostatnich trzech miesiącach ciąży nie wolno stosować żelu Voltaren Emulgel 1%.

Karmienie piersią:

Podczas karmienia piersią Voltaren Emulgel 1% może być stosowany jedynie na zalecenie lekarza.

**Producent:**

NOVARTIS CONSUMER

Marynarska 15

Warszawa