


## PHLEBODIA 600 mg, 30 tabletek powlekanych



cena: 37,50 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,6 g
Kategoria	Lek
Opakowanie	30 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	Mylan
Substancja czynna	Diosmina (Diosminum)
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

#### PHLEBODIA tabletki powlekane 600 mg 30 sztuk

**Phlebodia** jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i zmniejsza podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

#### Wskazania:

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

#### Jak przyjmować lek Phlebodia:

Ten lek należy zawsze przyjmować według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

##### Dawkowanie

Dorośli (w wieku od 18 lat)

Zalecana dawka w:

- niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletkę na dobę.
- żylakach odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.

##### Sposób stosowania

Podanie doustne.

Należy połknąć tabletkę popijając połową szklanki wody

## Co zawiera lek Phlebodia

- Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletkę zawiera 600 mg diosminy.
- Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972), celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka:

1. Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400, stearynian.
2. Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień koszenilowa A, pąs 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).
3. Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901).

## Kiedy nie przyjmować leku Phlebodia:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Phlebodia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

### Ostrzeżenia:

- jeśli dyskomfort i łamliwość włosów nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem
- jeśli objawy dotyczące żyłaków odbytu utrzymują się po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

### Środki ostrożności:

Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, wysokich temperatur, długiego stania, nadwagi. Noszenie odpowiednich pończoch uciskowych wspomaga prawidłowe krążenie krwi.

### Dzieci i młodzież:

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (od 18 lat).

### Lek Phlebodia a inne leki:

Istotne klinicznie interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceutce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

### Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Ciąża:

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

### Karmienie piersią:

W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

## Lek Phlebodia zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (E 124)

Lek zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (barwnik azowy), który może powodować reakcje alergiczne.

### Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

– bóle żołądka

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

– reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy lub gardła

– wzdęcia

– biegunka

– zaburzenia trawienia

– mdłości

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

– wymioty.

Zaburzenia trawienia rzadko prowadzą do zaprzestania leczenia

### Jak przechowywać lek Phlebodia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

### Podmiot odpowiedzialny:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

02-676 Warszawa