# Colon C 180g + 20g garatis

cena: 40,20 PLN

## Opis słownikowy

| | |
|---|---|
| Kategoria | Suplement diety |
| Opakowanie | 180 g |
| Postać | granulat |
| Producent | A-Z Medica Sp. z o.o. |
| Substancja czynna | Fruktooligosacharydy |
| Wysyłka | do 48 godzin, 1-2 dni |

## Opis produktu

Sporządzony jest z naturalnych składników ułatwiających perystaltykę jelit. Codzienna dawka Colon C zapewnia odpowiednią ilość błonnika i dostarcza jelitom przyjaznych bakterii. Łupiny nasion babki płesznik dostarczają błonnika, który zwiększając objętość, pobudza ściany jelit do pracy i przesuwania znajdującej się w nich masy. Obecność błonnika w jelitach sprzyja rozwojowi przyjaznych bakterii, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Fruktooligosacharydy (prebiotyki) zawarte w Colon C modyfikują florę jelitową i zwiększają populację bakterii z rodzaju Lactobacillus.

**Skład:**

łupiny nasion babki płesznik (Plantago psyllium), fruktooligosacharydy (prebiotyki), Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus.

**Wskazania:**

reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom, dostarcza błonnika i przyjaznych bakterii.

**Dawkowanie:**

2 czubate łyżeczki (10 g) dziennie - jedną przed śniadaniem, drugą przed kolacją. Zmieszać z wodą lub sokiem owocowym i natychmiast wypić. Istotne jest, by popić preparat dodatkową szklanką wody lub soku. Po dwóch tygodniach można zmniejszyć ilość preparatu o połowę.

**Ciąża i okres karmienia piersią:**

może być stosowany przez kobiety ciężarne i matki karmiące. Niemniej każda ciężarna kobieta winna najpierw zasięgnąć opinii

dietetyka. Zaleca się jednoczesne przyjmowanie preparatów multiwitaminowych i mineralnych zawierających kwas foliowy.

Podmiot odpowiedzialny:
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 13C
80-547 Gdańsk

Warunki ostrożności i przechowywanie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.