

Enterol 250 mg, 10 kapsułek



cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,25 g
Kategoria	Lek
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	Biocodex
Substancja czynna	Saccharomyces boulardii
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Enterol jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, zawierającym drożdżaki *Saccharomyces boulardii*.

Wskazania do stosowania:

- leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych
- zapobieganiu biegunkom poantybiotykowym
- nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem
- zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym
- zapobieganiu biegunkom podróżnych.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

substancję czynną: liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces boulardii* (250 mg),

substancje pomocnicze: laktozę jednowodną (32,5 mg), stearynian magnezu. W skład kapsułki żelatynowej wchodzi żelatyna i dwutlenek tytanu.

Zalecane dawkowanie:

ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia;

biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii;

biegunka spowodowana zakażeniem *C.difficile*: 4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni;

biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułki na dobę;

biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na możliwość zadławienia; zaleca się otwieranie

kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii

Ciąża i karmienie piersią:

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża: Nie zaleca się stosowania produktu Enterol 250 w czasie ciąży.

Laktacja: Saccharomyces boulardii nie wchłania się do mleka matki. Ze względu na brak danych, zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem produktu Enterol 250 w okresie karmienia piersią.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10000 osób): odnotowano kilka przypadków wzdęć.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 osób): wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd, reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, wysypka na całym ciele (osutka), przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia).

Częstość nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaparcia.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly, Francja