

## Laremid 2 mg, 10 tabletek



cena: 10,15 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Kategoria	Lek
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki
Producent	Polfa Warszawa S.A.
Substancja czynna	Loperamid
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

#### Skład:

1 tabletkę zawiera: 2 mg chlorowodoru loperamidu

#### Działanie:

Zawarty w preparacie loperamid hamuje motorykę jelit działając bezpośrednio na mięśnie gładkie ściany jelita, zmniejsza wydzielanie nabłonka jelitowego

Lek zwalnia szybkość pasażu treści jelitowej przez przewód pokarmowy, zmniejsza liczbę wypróżnień i poprawia konsystencję stolca

#### Wskazania:

Lek znalazł zastosowanie w objawowym leczeniu biegunek ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia

W leczeniu biegunki w przebiegu zaburzeń czynnościowych jelit

W lekkich zaostrzeniach nieswoistych zapaleń jelit

U pacjentów po operacjach, u których dokonano przetoki jelitowej

#### Przeciwwskazania:

w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na loperamid lub którykolwiek ze składników leku;

u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza bez zalecenia i kontroli lekarza;

do leczenia zasadniczego w stanach takich jak: ostra czerwonka przebiegająca z obecnością krwi w kale i wysoką gorączką, ostra faza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostra biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków. Lek należy odstawić, jeżeli wystąpi zaparcie lub wzdęcie brzucha.

#### Dawkowanie:

##### Ostra biegunka:

początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) dla dzieci; a następnie 1 tabletkę (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu.

##### Przewlekła biegunka:

początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej bieguncie wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę).

**Działania niepożądane:**

wysypka, pokrzywka i świąd

Pojedyncze przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevensa i Johnsona, rumienia wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozplywnej naskórka

pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję

ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, rozszerzenie okrężnicy, w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność

pojedyncze przypadki zatrzymania moczu

zawroty głowy

senność

**Interakcje:**

Podczas stosowania loperamidu z innymi lekami nie obserwowano interakcji o znaczeniu klinicznym.

**Uwagi:**

W przebiegu biegunki leczonej lekiem Laremid mogą pojawić się: zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Zawarty w preparacie loperamid hamuje motorykę jelit działając bezpośrednio na mięśnie gładkie ściany jelita, zmniejsza wydzielanie nabłonka jelitowego

Lek zwalnia szybkość pasażu treści jelitowej przez przewód pokarmowy, zmniejsza liczbę wypróżnień i poprawia konsystencję stolca

Postać

tabl.

Opakowanie

10 tabl.(blister)

Wskazania

Lek znalazł zastosowanie w objawowym leczeniu biegunek ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia. W leczeniu biegunki w przebiegu zaburzeń czynnościowych jelit. W lekkich zaostrzeniach nieswoistych zapaleń jelit. U pacjentów po operacjach, u których dokonano przetoki jelitowej

Dawkowanie

Zwykle podaje się: początkowo w ostrej bieguncie 2 tabletki, a następnie 1 tabletkę po każdym nieprawidłowym wypróżnieniu.

Maksymalna dawka leku nie może przekraczać 8 tabletek na dobę.

Producent

WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.