OTRIVIN AEROZOL 1MG/ML 10ML

cena: 25,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/1ml
Kategoria	Lek
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	Novartis
Substancja czynna	Ksylometazolina
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Działanie:

Ksylometazolina jest sympatykomimetykiem działającym na receptory alfa-adrenergiczne w błonie śluzowej nosa. Podana donosowo zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i sąsiadującej części gardła poprzez zwężenie naczyń krwionośnych. Umożliwia to łatwiejsze oddychanie osobom, u których występuje uczucie zatkanego nosa. Działanie produktu leczniczego Otrivin rozpoczyna się w ciągu kilku minut po podaniu i utrzymuje się do 12 godzin. Specjalny skład produktu leczniczego (substancje wykazujące działanie nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Zastosowanie:

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Przeciwwskazania:

Uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli pacjent przebył operację wykonywana przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej. Jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania.
Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Otrivin i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej: trudności w oddychaniu lub przełykaniu, opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami. Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania. Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Nie należy stosować więcej niż 3 dawki produktu do każdego otworu nosowego na dobę. Nie należy stosować dłużej niż 10 dni. Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1 dawka aerozolu Otrivin do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Producent:
NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa