

## RED RICE & Q10 60 TABLETEK



cena: 122,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	Suplement diety
Producent	Svenska Vitaminer
Wysyłka	do 48 godzin, 1-2 dni

### Opis produktu

**Preparat Red Rice & Q10** zawiera w swoim składzie Synistat® - opatentowany czerwony ryż, będący naturalnym źródłem monakoliny K, która pomaga w utrzymaniu cholesterolu na prawidłowym poziomie. Dodatkowo, produkt zawiera opatentowany koenzym Q10 - Kaneka Q10®, opatentowaną astaksantyne - AstaReal® oraz witaminy szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego: E, B6, B12 i kwas foliowy.

#### Sposób użycia:

2 tabletki dziennie, najlepiej wieczorem. Tabletki zaleca się połykać w całości popijając wodą.

Polecany jest osobom po 20 roku życia chcącym kontrolować swój poziom cholesterolu, podwyższonym poziomem homocysteiny, żyjącym w stresie, palącym, z nadwagą lub otyłością

#### 2 tabletki zawierają:

opatentowany fermentowany czerwony ryż w tym monakolina K 666 mg 10 mg. Kaneka Q10™(koenzym Q10) 30 mg. Astaksantyna z mikroalg *Haematococcus pluvialis* 2 mg. Witamina E 12 mg (100%)\*. Witamina B6 1,4 mg (100%)\*. Witamina B12 2,5 µg (100%)\*. Kwas foliowy 200 µg (100%)\*

#### Składniki:

Substancja wypełniająca (celuloza), Synistat® (fermentowany czerwony ryż) w tym monakolina K, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), mikroalgi *Haematococcus pluvialis* w tym astaksantyna, octan DL-alfa-tokoferylu, Kaneka Q10™ (koenzym Q10), nośnik (poliwinylpirolidon), przeciwutleniacze (kwas askorbinowy, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego), substancja przeciwzbrylająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy), cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, substancje glazurujące (hydroksypropylometyloceluloza, glicerol).

#### Warunki ostrożności i przechowywanie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla

funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.