Succ. Hyperici Phytopharm,(Sok z dziurawca),100 ml

cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Lek
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn doustny
Producent	PhytoPharm
Substancja czynna	Sok z dziurawca
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Succ. Hyperici Phytopharm,(Sok z dziurawca),100 ml

Succus Hyperici Phytopharm jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania we wskazaniach wynikających z jego długotrwałego stosowania.
Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w niestrawności.

Skład:

Lek zawiera Hyperici herbae recentis succus (1:1) – sok stabilizowany sporządzony etanolem ze świeżego ziela dziurawca (1:1) 100 ml.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny – etanol 96% (V/V), woda.
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 25-35% (V/V).

Przeciwskazania:

Nie należy stosować leku:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną,
w przypadku uszkodzeń wątroby, np. w wyniku choroby alkoholowej, po zatruciach – ze względu na zawartość etanolu w preparacie,
u osób po transplantacjach organów oraz zakażonych wirusem HIV otrzymujących inhibitory proteazy-1 (np. indynawir),
przy nadwrażliwości na promienie ultrafioletowe.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie:

Dorośli:
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować do 3 razy dziennie po 2,5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat:
Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:
Jeżeli objawy nie ustąpią po 7 dniach, należy konsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Succus Hyperici Phytopharm jest za mocne lub za słabe, nalezy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko mogą wystąpić łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, niepokój, zmęczenie, bóle głowy lub reakcje alergiczne.
U osób z jasną karnacją mogą wystąpić podczas stosowania leku odczyny zapalne skóry (wysypka, rumień).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Hyperici Phytopharm

WW przypadku zużycia większej dawki leku Succus Hyperici Phytopharm niż zalecana mogą wystąpić objawy związane z zawartością etanolu. Stosowanie leku niezgodnie z zaleconym dawkowaniem może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu watroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu oraz w chorobach umysłowych. Przedawkowanie preparatu może nastąpić przy zażyciu dużo większych dawek niż terapeutyczne lub zbyt długim stosowaniu i może objawiać się reakcjami fototoksycznymi, takimi jak wysypka, świąd, rumień.

Lek Succus Hyperici Phytopharm i inne leki

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Succus Hyperici Phytopharm z innymi lekami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na wątrobę. Preparat może powodować obniżenie poziomu następujących leków we krwi: cyklosporyny, indynawiru oraz innych inhibitorów poteazy-1 lub inhibitorów transkryptazy, fenprokumonu, warfaryny, teofiliny i digoksyny. Nie zaleca się stsowania preparatów z dziurawca łącznie ze środkami przeciwdepresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny. Sok z dziurawca może osłabiać działanie doustnych środków antykoncepcyjnych.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Producent:
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą